


INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER:

DONEPEZIL



LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne.

Exempel på läkemedel med olika namn men som innehåller det verksamma ämnet donepezil är: **Aricept, Donepezil Actavis, Donepezil Accord, Donepezil Aurobindo, Donepezil bluefish, Donepezil Jubilant, Donepezil Krka, Donepezil Orifarm, Donepezil Sandoz, Donepezil STADA.**

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DONEPEZIL?

Läkemedlet verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen har nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DONEPEZIL?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Tabletter innehållande donepezil tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.
- Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.
- Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska. Munsönderfallande tabletter placerar du på tungan och låter dem smälta innan du sväljer, med eller utan vatten.

VAD GÖR MAN OM MAN:

- **Glömt att ta en dos?**

Om du glömmer bort att ta en tablett, ta en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du glömmer bort att ta din medicin under flera dagar, kontakta din behandlande mottagning innan du tar någon mer medicin.

Kontakta även din läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att ta din medicin. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

- **Tagit dubbel dos?**

Hoppa över de två nästkommande ordinarie doserna, fortsatt sedan som vanligt.

Känner du något obehag ska du kontakta läkare.

VILKA BIVERKNINGAR KAN DONEPEZIL GE?

En del personer får biverkningar av donepezil. Besvären varierar från person till person.

Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring, huvudvärk. Som regel är dessa biverkningar övergående.

Somliga kan få sömnproblem. Ibland kan det då hjälpa att ta läkemedlet på morgonen istället för på kvällen. Ändra dock aldrig din medicinering utan att kontakta din läkare.

Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR DONEPEZIL?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och donepezil är inte specifikt studerad.

VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH FEBER KAN JAG TA MED DONEPEZIL?

För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. Panodil, Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol (t. ex. Citodon, Panodil, Alvedon).

Äldre personer bör undvika läkemedel innehållande ibuprofen (t. ex. Ipren, Ibumetin), diklofenak (t. ex. Voltaren), acetylsalicylsyra (t. ex. Treo), nabumeton (Relifex), naproxen (t. ex. Pronaxen) om man inte blivit rekommenderad dessa av läkare.

HUR SKA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DONEPEZIL FÖRVARAS?

Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling.

Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Framtagen av:

Hälsostaden Ängelholms sjukhus

Enheten för Kognitiv Medicin, Specialistminnesmottagningen

Reviderad: Januari 2016, Emmy Andersson, apotekare

www.skane.se

