


INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER:

RIVASTIGMIN

PLÅSTER



LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. **Exelon** och **Orivast** är läkemedel i plåsterform som innehåller det verksamma ämnet rivastigmin.

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

HUR SKA MAN ANVÄNDA PLÅSTER SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

- På apoteketiketten står vilken dos du ska ta.
- Plåstret ska bytas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Ta bort föregående dags plåster innan du sätter på ett nytt.
- Använd bara ett plåster i taget.
- Plåstret ska fästas på ren, torr (och fri från hudlotion), hårfri, oskadad hud på övre eller nedre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen (undvik själva bröstet). Plåstret ska fästas på ett nytt ställe varje gång.
- Klipp inte i plåstret.
- Du kan behålla plåstret på vid dusch och bad. Var försiktig med att utsätta plåstret för yttre värme under längre tid (t ex solande, bastu).
- Se bruksanvisning i förpackningen för detaljerad information om hur du bör använda plåstret.

VAD GÖR MAN OM MAN:

- **Glömt att byta plåster?**

Om du upptäcker att du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt omedelbart. Glöm inte att ta bort det gamla. Du kan sedan byta plåster i vanlig tid nästa dag. Sätt inte på två plåster för att kompensera för ett glömt plåster. Om du glömmer bort att använda plåster under mer än tre dagar, sätt inte på något nytt plåster innan du har kontaktat din behandlande mottagning. Kontakta även din läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att använda dina plåster. Det finns möjlighet att få hjälp med medicinutdelning. Om det hjälper dig att komma ihåg om du bytt plåster kan du anteckna veckodag på plåstret med kulspetspenna. Du kan även anteckna på ett schema när du bytt plåster.

- **Använt för hög dos?**

Om du oavsiktligt satt på fler än ett plåster, ta av alla plåstren från huden och ta kontakt med din läkare eller sjuksköterska.

- **Ett plåster faller av?**

Om ett plåster faller av, sätt på ett nytt för resten av dagen, byt sedan till ett nytt igen vid den vanliga tiden nästa dag.

VILKA BIVERKNINGAR KAN PLÅSTER MED RIVASTIGMIN GE?

En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående, kräkningar och aptitförlust. Som regel är dessa biverkningar övergående. Somliga personer får hudirritationer av plåster med rivastigmin. Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN ANVÄNDER PLÅSTER SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan.

Kombinationen alkohol och rivastigmin är inte specifikt studerad.

VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH FEBER KAN JAG TA MED RIVASTIGMIN?

För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. Panodil, Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan använder läkemedel på recept som innehåller paracetamol (t. ex. Citodon, Panodil, Alvedon). Äldre personer bör undvika läkemedel innehållande ibuprofen (t. ex. Ipren, Ibumetin), diklofenak (t. ex. Voltaren), acetylsalicylsyra (t. ex. Treo), nabumeton (Relifex), naproxen (t. ex. Pronaxen) om man inte blivit rekommenderad dessa av läkare.

HUR SKA PLÅSTREN FÖRVARAS?

Förvaring ska ske i rumstemperatur. Förvara plåstren i plåsterkuverten tills de ska användas.

HUR SKA PLÅSTREN KASTAS?

Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Lägg tillbaka det använda plåstret i plåsterkuvertet och lämna till apoteket.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling.

Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Framtagen av:

Hälsostaden Ängelholms sjukhus

Enheten för Kognitiv Medicin, Specialistminnesmottagningen

Reviderad: Januari 2016, Emmy Andersson, apotekare

www.skane.se

