

Demencija sa Levijevim telima

INFORMATIVNI LIST ŠVEDSKOG CENTRA ZA DEMENCIJU

Lewykroppsdemens • faktablad på bosniska | kroatiska | serbiska

Relativno nova dijagnoza

Demencija je zajednički naziv niza simptoma koji otežavaju mišljenje, planiranje i komunikaciju. Ovi simptomi prouzrokuju različita oštećenja i oboljenja mozga. Jedna od najobičnijih bolesti demencije je demencija sa Levijim telima, takođe zvana Lewy body demencija.

Demencija sa Levijim telima je relativno nova dijagnoza koja obično nastaje kod osoba starijih od 65 godina. Bolest je svoj naziv dobila od sitnih gomilanja proteina u mozgu, "Levijevih tela", koja su tipična za ovu bolest.

Nekoliko tipičnih simptoma

Demencija sa Levijevim telima prouzrokuje vidne halucinacije, to jest da osoba ponekad vidi predmete i druge osobe kojih ustvari nema. Karakteristično za ovu bolest je takođe veće poteškoće u pogledu procenjanja razdalina i shvatanja stvari na trodimenzionalni način, a što otežava orijentaciju i obavljanje praktičnih poslova.

Svakodnevnicu pacijenta otežavaju i ukočeni mišići i usporeni pokreti, telesni simptomi koji se javljaju u ranoj fazi toka bolesti i koji su inače povezani sa Parkinsonovom bolešću.

Poremećeni san obična pojava na početku bolesti

Demencija sa Levijevim telima se javlja podmuklo. Prvi znak može da bude poremećeni san – osoba spava nemirno, vrišti i maše rukama u snu. Osoba se može osećati zbunjeno, na izgled bez ikakvog razloga. Zaboravnost i poteškoće da pronade reči, znakovi koji su uobičajeni na početku bolesti demencije, manje su istaknute crte kod demencije sa Levijevim telima.


Stanje može jako varirati

Postepeno simptomi postaju sve više očiti i utiču kako na duševne tako i na telesne funkcije. Osoba se obično oseća umorno i spava dugo, ponekad i u toku dana. Bolest otežava i pozornost. Druga tipična karakteristika demencije sa Levijevim telima je da se stanje osobe jako varira iz dana u dan. Takođe i krvni pritisak, koji je često nizak, može neobjašnjivo varirati gore dole.

Bitno je postaviti dijagnozu rano

Demencija sa Levijevim telima se ne može utvrditi prostim nalazom. Dijagnoza se zasniva na nizu testova, pregleda i razgovora sa pacijentom i članovima njegove porodice.

Ispitivanje radi utvrđivanja demencije obično traje četiri do šest sedmica. Važno je da se ispitivanje odmah započne da bi bilo moguće blagovremeno pružiti pravu pomoć i lečenje. Za sada nema leka protiv ove bolesti, ali postoje različite načine da se simptomi ublaže.



Različite načine da se simptomi ublaže

Karakteristično za demenciju sa Levijevim telima je da neuroleptici, koji se u normalnim slučajevima daju protiv vidnih halucinacija, mogu prouzrokovati ozbiljne neželjne posledice. Zato ove lekove treba izbegavati. Međutim, više lekova koji su unapređeni protiv Alzheimerove bolesti i Parkinsonove bolesti mogu imati dobro dejstvo, prvenstveno na početku toka bolesti.

Osobama koje boluju od demencije sa Levijevim telima potrebno je mnogo pomoći. Pomagala i druge mere mogu olakšati svakodnevnicu pacijenta. Takođe je važno dobiti objašnjenje o simptomima da bi se na najbolji način moglo planirati za što bolji i osmišljeniji život.

Postepeno biće potrebna sve veća podrška i pomoć od strane društvene zdravstvene zaštite i brige.

15 Juli 2013 • Svenskt Demenscentrum©

Više informativnih listova na raznim jezicima može se ispisati sa portala Švedskog centra za demenciju:
www.demenscentrum.se/Faktablad



Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se