

Lijekovi i demencija

INFORMATIVNI LIST ŠVEDSKOG CENTRA ZA DEMENCIJU

Läkemedel och demenssjukdom • faktablad på BKS (Bosniska, Kroatiska, Serbiska)

Lijekovi mogu ublažiti simptome

Bolesti demencije, koje se nazivaju i kognitivne bolesti, dovode do različitih oštećenja mozga. One utječu na pamćenje, sposobnost razmišljanja, govor i druge, takozvane, kognitivne funkcije. Jednostavni poslovi, stoga, bivaju sve teži za obavljanje i postepeno je potrebno sve više pomoći za snalaženje u svakodnevnom životu.

Danas ne postoji lijek za demenciju. Međutim, postoje lijekovi koji u mnogim slučajevima mogu ublažiti simptome Alchajmerove bolesti, najčešće bolesti demencije. Neki mogu imati dobar učinak čak i kod demencije s Levijevim tijelima, te kod Parkinsonove bolesti s demencijom.

Četiri aktivne supstance

Postoje četiri aktivne supstance koje mogu utjecati na simptome. One ulaze u sastav različitih lijekova koji se prodaju u apotekama pod različitim nazivima. Tri od ovih aktivnih supstanci idu pod zajedničkim nazivom *inhibitori kolinesteraze* i propisuju se u ranim stadijima bolesti demencije.

- *Donepezil*
- *Galantamin*
- *Rivastigmin*


Sve tri odlažu razgradnju *acetilholina*, neurotransmitera u mozgu. Na taj način mogu kompenzirati smanjenu proizvodnju acetilholina do koje dovodi Alchajmerova bolest. To znači da pamćenje, učenje, koncentracija i sposobnost govora mogu neko vrijeme bolje funkcionirati i na taj način doprinijeti olakšavanju obavljanja različitih dnevnih aktivnosti.

U kasnijim stadijima bolesti

Memantin je četvrta aktivna supstanca. Ponekad se propisuje kao dopuna inhibitorima kolinesteraze (vidjeti iznad), ali može djelovati čak i u kasnijim stadijima bolesti.

Budući da memantin poboljšava prijenos određenih nervnih signala u mozgu, osoba može

nešto bolje funkcionirati. Čak se i simptomi koji imaju veze s ponašanjem mogu ublažiti. Efekti se, međutim, mogu razlikovati od osobe do osobe, što se odnosi na sve četiri aktivne supstance.



Mogu se javiti neželjeni efekti

Mogu se javiti neželjeni efekti kao što su mučnina, glavobolja i smanjen apetit. Često su prolazog karaktera. U suprotnom, obratite se svom ljekaru ili medicinskoj sestri.

Važno je da se vaš tretman lijekom isprati. Vaš ljekar će možda morati prilagoditi dozu ili vam promijeniti lijek. Ljekar treba procijeniti i korist od liječenja.

Apoteke pružaju savjete

Apoteke ponekad predlažu lijek koji se razlikuje od onoga što je ljekar propisao. Tada to mora biti lijek koji sadrži iste aktivne supstance i samim tim ima isto dejstvo. U apoteci možete dobiti i informacije o neželjenim efektima i načinu uzimanja lijeka.

Slobodno pitajte svog ljekara za pakete doza lijekova, oni olakšavaju praćenje uzimanja lijekova.

2022 • Svenskt Demenscentrum©

Ljekar mi je prepisao aktivnu supstancu:

Dostupna kao lijek u apoteci pod nazivom:

Više informativnih listova na različitim jezicima može se štampati sa web stranice Švedskog centra za demenciju: demenscentrum.se/Faktablad



Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm, 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se