

Démences fronto-temporales

FICHE D'INFORMATION DU CENTRE SUÉDOIS DES MALADIES DE LA DÉMENCE

Frontotemporal demens • faktablad på franska

Affecte la partie frontale du cerveau

La démence fronto-temporale est également appelée démence frontale ou démence du lobe frontal. La maladie entraîne une détérioration des cellules nerveuses de la partie frontale du cerveau; le lobe frontal ou la partie temporale derrière les tempes. Les symptômes apparaissent subtilement, de la même manière insidieuse que la maladie d'Alzheimer. Mais il existe des différences substantielles entre ces deux maladies.

Aucuns symptômes typiques de démence

L'oubli et les difficultés à apprendre quelque chose de nouveau, des signes précoces d'Alzheimer, ne sont pas typiques à la démence fronto-temporale. Ces symptômes ne se manifestent que tardivement dans l'évolution de la maladie. La démence fronto-temporale se reconnaît soit par un changement du comportement soit des troubles du langage, selon la partie du cerveau dans laquelle la maladie est apparue.

La personnalité change

Le lobe frontal est le plus souvent atteint en premier lieu lors de démence fronto-temporale. La concentration, le jugement et les impulsions sont contrôlés par cette partie. La personnalité chez la personne atteinte commence lentement à changer et elle se comporte de plus en plus souvent sans preuve de jugement.


D'autres signes précoces sont des difficultés croissantes à prendre des initiatives et des explosions de colère inexplicables. Il est fréquent que la personne devienne agitée, émotionnellement froide et parfois apathique. La capacité à ressentir de l'empathie envers d'autres se détériore petit à petit. Une sur-consommation de nourriture, de tabac ou d'alcool peut également être un signe.

Des troubles du langage dans certains cas

La démence fronto-temporale peut également commencer dans la partie avant des lobes temporaux jouant un rôle important pour le langage. Dans certains cas, nous parlons d'*aphasie progressive*. Cela peut se manifester par une détérioration de la compréhension de vocabulaires et des problèmes à dénommer différentes choses telles que voiture ou clé. Cela peut également se manifester par un langage amoindri et saccadé contenant de nombreuses fautes de grammaire.

Vous avez besoin de plus d'aide

Il n'est pas rare que la démence fronto-temporale apparaisse déjà vers l'âge de 50–60 ans. La maladie peut ensuite évoluer sur de nombreuses années. Les symptômes deviennent petit à petit de plus en plus nombreux avec l'évolution de la lésion du cerveau. Il est de plus en plus difficile de s'occuper de soi au quotidien et, petit à petit, la personne atteinte a besoin d'aide à s'habiller, prendre soin de son hygiène.



Un diagnostic précoce est important

La démence fronto-temporale peut être confondue avec la dépression, le syndrome d'extrême fatigue. Puisque l'oubli et d'autres symptômes de démence typiques ne sont pas fréquents au début, la maladie peut être difficile à découvrir.

Veuillez contacter un médecin si vous soupçonnez qu'un proche soit ou que vous-même soyez atteint(e) de démence fronto-temporale. Une évaluation devrait être démarrée le plus tôt possible. Généralement, cette évaluation est faite dans une clinique spécialisée (service de la mémoire) et est constituée d'une série de tests et d'analyses ainsi que d'entretiens avec les personnes proches.

Traitement et attitude

La recherche a fait des progrès mais il n'existe encore pas de moyens d'enrayer l'évolution de la démence fronto-temporale. Il est tout de même important d'obtenir une explication des symptômes afin de pouvoir planifier une vie aussi agréable et importante que possible.

Des dispositifs d'assistance et des bons soins peuvent de différentes manières faciliter le quotidien. Il est également important d'essayer de créer un environnement paisible autour de la personne malade puisque le stress fait empirer les symptômes.

7 avril 2016 • Svenskt Demenscentrum©

D'autres feuillets d'information, dans différentes langues, peuvent être consultés à partir du site Web du Centre suédois des maladies de la démence: www.demenscentrum.se/Faktablad



Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se