

Деменция с тельцами Леви

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ШВЕДСКОГО ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ ДЕМЕНЦИИ

Относительно новый диагноз

Деменция - общее название целого ряда симптомов, затрудняющих процесс общения, снижающих способность здраво мыслить и планировать.

Причиной возникновения этих симптомов являются различные повреждения и заболевания головного мозга. Одним из распространенных типов деменции является деменция с тельцами Леви.

Это относительно новый диагноз, такой тип деменции - если он развивается - то как правило, у лиц старше 65 лет. Болезнь получила свое название по причине накопления в клетках головного мозга белковых включений, так называемых «телец Леви».

Некоторые типичные симптомы

Деменция с тельцами Леви становится причиной возникновения галлюцинаций, т. е. человек видит предметы или людей, которых в действительности нет. Помимо этого для заболевания характерно появление сложностей с определением расстояния и трехмерным восприятием действительности, что, в свою очередь, затрудняет возможность ориентироваться и выполнять какую-либо практическую работу.

Повседневная жизнь усложняется также из-за ригидности мышечных тканей и замедленности движений - физических симптомов, проявляющихся уже на ранних стадиях заболевания, но которые принято больше связывать с болезнью Паркинсона.

Нарушение ночного сна - обычное явление для начальной стадии заболевания

Деменция с тельцами Леви появляется незаметно. Первым признаком заболевания могут быть нарушения ночного сна - больной спит беспокойно, кричит во сне или размахивает руками. Человек может чувствовать себя растерянным, без каких-либо видимых причин. Забывчивость или затруднения с подбором нужных слов - обычные признаки начальной стадии деменции - в этом случае не так очевидны.

Состояние больного может очень сильно колебаться

Со временем симптомы становятся все более заметными, болезнь влияет как на умственные, так и на физические возможности организма. Человек часто чувствует себя утомленным, долго спит, иногда - даже днем. Болезнь снижает возможность концентрации внимания. Еще одной типичной чертой деменции с

тельцами Леви является то, что состояние больного в разные дни может быть очень сильно колебаться. Кровяное давление, которое часто бывает пониженным, тоже может колебаться, поднимаясь и опускаясь, без каких-либо видимых причин.

Важен ранний диагноз

Деменция с тельцами Леви не может быть определена посредством простого анализа. Диагноз может быть поставлен в результате проведения целого ряда тестов, обследований и бесед с пациентом и его родными.

Такое обследование занимает обычно от четырех до шести недель. Важно начать обследование как можно раньше чтобы своевременно получить нужную помощь и лечение. В настоящее время нет средства, способного излечить заболевание, но симптомы можно уменьшить.



Различные способы уменьшения симптомов

Следует отметить, что нейролептики, назначаемые обычно при галлюцинациях, в случае больных деменцией с тельцами Леви, могут вызвать серьезные побочные эффекты. По этой причине этих лекарственных препаратов следует избегать.

Препараты же, разработанные для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона, дают хороший эффект, в первую очередь, на начальных стадиях заболевания.

Лицам, страдающим деменцией с тельцами Леви, необходима значительная поддержка. Средства реабилитации и другая помощь могут облегчить повседневную жизнь. Помимо этого важно получить разъяснение в отношении заболевания и его симптомов чтобы спланировать качественную и наполненную смыслом жизнь.

Со временем потребность в помощи и поддержке со стороны общества и учреждений здравоохранения будет увеличиваться.

Шведский центр по вопросам деменции©

Другие информационные листки, на разных языках, можно распечатать с сайта Шведского Центра по вопросам деменции: www.demenscentrum.se/Faktablad



Svenskt Demenscentrum

Шведский центр по вопросам деменции, Стокгольм, Швеция. тел. 08 - 690 58 00, info@demenscentrum.se

www.demenscentrum.se